

Anexo 1: Criterios Ryge del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (USPHS) modificados para la evaluación clínica directa de la restauración.

Criterio	Alpha (A)	Bravo (B)	Charlie (C)
Igualdad de color	La restauración iguala el matiz y translucidez de los tejidos dentarios adyacentes	Ligera diferencia en el matiz o translucidez de la restauración	La restauración es diferente en matiz y translucidez respecto a los tejidos dentarios adyacentes
Textura superficial	Textura superficial lisa, similar a la del esmalte pulido al explorar con sonda	Ligeramente rugosa o arenosa	Superficie con poros lo suficientemente grosero como para impedir el movimiento continuo con un explorador
Contorno o pérdida de sustancia (desgaste)	La restauración es una continuación de la forma anatómica existente.	Evidente concavidad en la superficie. La dentina o la base no se encuentran expuestas.	Pérdida de sustancia de la restauración, evidente concavidad de la superficie. Base y/o dentina expuesta
Decoloración del margen cavo-superficial	No hay evidencia visual de decoloración marginal	Hay evidencia visual de decoloración marginal en la unión de la estructura dentaria y la restauración, pero esta decoloración no penetra la restauración en dirección a la pulpa	Hay evidencia visual de decoloración marginal, la cual penetra la restauración en dirección pulpar.
Integridad marginal	No existen hendiduras al explorar con sonda, o, si esta se engancha, no existe fisura evidente a lo largo de la periferia de la restauración	El explorador se engancha y hay una fisura evidente, la cual es penetrada por el explorador, indicando que el borde de la restauración no se adapta íntimamente al diente. La dentina y/o base no están expuestas. La restauración no es móvil	El explorador penetra la fisura que se extiende hasta la unión amelodentinaria
Caries secundaria	La restauración es una continuación de la forma anatómica existente adyacente a ella. No hay caries secundaria.	Hay evidencia de decoloración oscura adyacente a la restauración correspondiente a caries secundaria.	
Retención de la restauración	La restauración está intacta y completamente retenida	La restauración se encuentra parcialmente retenida, con una porción de ella todavía intacta	La restauración se encuentra completamente perdida