

## Anexos

### Anexo 1: Rondas Delphi para la validación de casos clínicos.

#### Caso clínico: Analgésicos opioides 1

##### Receta cheque

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.71	5	4	5
2	6	4.83	5	4	5

#### Caso clínico: Analgésicos opioides 2

##### Receta cheque

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.71	5	4	5
2	6	4.83	5	4	5

#### Caso clínico: Anticoagulante 1

##### Receta simple

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.85	5	4	5
2	4	4.83	5	4	5

#### Caso clínico: Anticoagulante 2

##### Receta simple

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.71	5	3	5
2	6	4.66	5	4	5

#### Caso clínico: Antibióticos 1

##### Receta simple

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	4.66	5	3	5
2	6	4.5	4 y 5	4	5

#### Caso clínico: Antibióticos 2

##### Receta simple

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.57	5	3	5
2	6	4.66	5	4	5

**Caso clínico: Benzodiazepinas 1****Receta retenida**

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.42	5	3	5
2	6	4.33	5	3	5

**Caso clínico: Benzodiazepinas 2****Receta retenida**

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.42	5	3	5
2	6	4.5	4 y 5	4	5

**Caso clínico: Vitamina D****Receta magistral**

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.71	5	3	5
2	6	4.5	4 y 5	4	5

**Caso clínico: Polietilenglicol (PEG)****Receta magistral**

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.57	5	3	5
2	6	4.66	5	4	5

**Anexo 2:** Rondas Delphi para la validación de ítems de pauta de corrección.

**Ítem 1:** Selección adecuada del tipo de receta para medicamento a prescribir

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	5	5	5	5
2	7	5	5	5	5

**Ítem 2:** Elección de medicamento acorde al caso presentado, considerando contraindicaciones e interacciones farmacológicas.

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	5	5	5	5
2	7	5	5	5	5

**Ítem 3:** Prescripción de medicamento sin abreviaturas y con nombre genérico (opcionalmente puede incluir una marca específica).

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	4.83	5	4	5
2	7	4.85	5	4	5

**Ítem 4:** Inclusión de concentración correcta del principio activo.

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	5	5	5	5
2	7	5	5	5	5

**Ítem 5:** Elección adecuada de forma farmacéutica del fármaco prescrito.

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	4.66	5	3	5
2	7	5	5	4.71	5

**Ítem 6:** Elección adecuada de vía de administración de fármaco prescrito.

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	4.83	5	4	5
2	7	5	5	5	5

**Ítem 7:** Elección adecuada de dosificación del fármaco prescrito, explicitando horario de administración si aplica.

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	5	5	5	5
2	7	5	5	5	5

**Ítem 8:** Elección adecuada de duración de tratamiento farmacológico prescrito.

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	5	5	5	5
2	7	5	5	5	5

**Ítem 9:** Receta incluye datos del prescriptor (nombre, RUT, firma de prescriptor).

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	4.5	4 y 5	4	5
2	7	4.85	5	4	5

**Ítem 10:** Receta incluye datos del paciente (nombre, edad, RUT; fecha de nacimiento y dirección en caso de retenida o cheque).

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	5	5	5	5
2	7	5	5	5	5

**Ítem 11:** Receta incluye fecha de prescripción, especificando día, mes y año.

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	5	5	5	5
2	7	5	5	5	5

**Ítem 12:** Letra clara, legible y que pueda ser leída por todos.

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	5	5	5	5
2	7	5	5	5	5

**Anexo 3:** Medidas del coeficiente de la correlación de concordancia de Lin de las puntuaciones totales y por receta.

	Media	DS	Min	Max	Rho_C	IC Rho_C
<b>Puntuación total (144 recetas)</b>						
<b>Evaluador 1</b>	21,14	2,83	0	24	0,873	0,835 a 0,911
<b>Evaluador 2</b>	21,19	3,17	0	24		
<b>Receta simple (83 recetas)</b>						
<b>Evaluador 1</b>	21,29	3,08	0	24	0,895	0,853 a 0,938
<b>Evaluador 2</b>	21,29	3,39	0	24		
<b>Receta retenida (35 recetas)</b>						
<b>Evaluador 1</b>	21,03	2,82	10	24	0,893	0,825 a 0,961
<b>Evaluador 2</b>	21,44	2,95	10	24		
<b>Receta cheque (26 recetas)</b>						
<b>Evaluador 1</b>	20,81	1,96	16	24	0,693	0,508 a 0,878
<b>Evaluador 2</b>	20,65	2,76	13	24		

\*Coeficiente de concordancia de Lin. Desviación estándar (DS), mínimo (Min), máximo (Max), coeficiente de concordancia de Rho (Rho\_C) e intervalo de confianza (IC).